

Information avulsions

Quand sont indiquées les avulsions dentaires

Elles sont indiquées :

- Lorsque les dents constituent un risque infectieux et ne peuvent bénéficier de traitements conservateurs et/ou prothétiques, ceci afin de prévenir les risques de complications infectieuses ;
- En vue d'une réhabilitation prothétique.

Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention s'effectue sous anesthésie locale au sein du cabinet avec une prise en charge adaptée de votre stress.

Quelles sont les suites opératoires ?

Les suites opératoires normales sont :

- **L'œdème** (gonflement des joues), la douleur, la limitation de l'ouverture de la bouche, ainsi qu'un petit saignement de quelques heures ;
- Une **gêne esthétique** est possible **ainsi que fonctionnelle** (phonation et mastication).

Tout acte chirurgical, même bien mené, comporte des risques de complications, qui doivent cependant être relativisés au regard des bénéfices attendus :

- Hématome et saignement persistant ;
- Alvéolite : inflammation ou infection de l'alvéole dentaire ;
- Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche ;
- Lésion d'une dent voisine, descellement d'une couronne, fracture d'une restauration, d'un bridge ou d'une dent ;
- Communication entre la bouche et le sinus qui se ferme le plus souvent spontanément (4 à 8 semaines).
En cas de persistance, une intervention sera nécessaire pour obtenir sa fermeture.

Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, pour votre cas précis, les risques et les effets secondaires de cet acte.

En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec le cabinet par mail et de prendre une photographie.