

Information dents de sagesse

Pourquoi retirer les dents de sagesse ?

Les avulsions des dents de sagesse ou troisième molaires (appelées germes lorsque les racines sont absentes ou incomplètes) sont indiquées en raison d'un mauvais positionnement, d'un manque de place, d'accidents douloureux, inflammatoires, infectieux, tumoraux...

Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention s'effectue sous anesthésie locale au sein du cabinet avec une prise en charge adaptée du stress. Une radiographie préopératoire est indispensable pour évaluer la position des dents et la proximité des nerfs.

Quelles sont les suites opératoires ?

Les suites opératoires normales sont : l'**œdème** (gonflement des joues), la **douleur**, la **limitation de l'ouverture de la bouche**, ainsi qu'un **petit saignement de quelques heures**.

Tout acte chirurgical, même bien mené, comporte des risques de complications, qui doivent cependant être relativisés au regard des bénéfices attendus :

- Hématome et saignement persistant ;
- Alvéolite : inflammation ou infection de l'alvéole dentaire ;
- Cellulite : inflammation ou infection des tissus mous de la face ou de la bouche ;
- Lésion d'une dent voisine, descellement d'une couronne, fracture d'une restauration dentaire, d'un bridge ou d'une dent ;
- Perte ou diminution de la sensibilité de la lèvre ou de la langue, le plus souvent transitoire (quelques semaines à quelques mois), et exceptionnellement définitive ;
- Fracture osseuse (notamment l'angle de la mandibule) pendant l'intervention ou pendant la phase de consolidation ;
- Communication entre la bouche et le sinus qui se ferme le plus souvent spontanément (4 à 8 semaines). **En cas de persistance, une intervention sera nécessaire pour obtenir sa fermeture.**
- Projection d'une dent de sagesse supérieure ou d'un fragment dans le sinus, en arrière du sinus ou dans la joue, pouvant justifier d'une nouvelle intervention.

Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé, pour votre cas précis, les risques et les effets secondaires de cet acte.

En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec le cabinet par mail et de prendre une photographie.